

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります)

## 登園届 (保護者記入)

保育園長様

園児氏名

年 月 日 医療機関「

」において

下記疾患の診断を受けました。

症状が回復しましたので、登園いたします。

年 月 日

保護者氏名

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが快適に生活できることが大切です。

保育園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

○ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

\* 下記の感染症に○を記入してください。

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	解熱し、便が軟便～普通便になり、抗菌薬内服後24時間以上経過した後
RSウイルス感染症	症状が出てから通常3～8日（乳幼児では3～4週も続くことがある）	症状が安定した後
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	症状が安定した後
ヘルパンギーナ	発症後数日間（便中に1か月ウイルスが出続ける）	解熱し普段の食事がとれるようになって丸1日経過後
手足口病	発症後数日間（便中に1か月ウイルスが出続ける）	解熱し普段の食事がとれ、全ての発疹、水疱がかさぶたになって、丸1日経過後
伝染性紅斑(りんご病)	風邪症状出現から発疹出現するまで	全身状態が安定してから
感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス)	症状がある間と、症状消失後1週間程度（便中には数週間ウイルスが出続ける）	主な症状が消え（便が軟便～普通便になった事を確認後）2日経過してから
帯状疱疹	水疱を形成している間	全ての発疹がかさぶたになってから
突発性発しん	発熱している間	解熱し、機嫌が良く全身状態が良くなってから
伝染性膿痂疹(とびひ)	効果的治療開始後まで	皮膚が全て乾燥しているか、湿潤部位が被覆できる程度になってから
アタマジラミ	産卵から最初の若虫が孵化するまでの期間は10～14日間	受診し駆除を開始後
伝染性軟属腫(水いぼ)	水いぼが消失するまで	掻きこわし傷から滲出液が出ている時は被覆する